

BRUGSANVISNING:

Turflin[®] plænerens er et systemisk og kontaktvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i plæner, på golf- og boldbaner samt i parker og på andre græsarealer. Bekæmpelsen foretages forår eller sommer. **Turflin[®] plænerens** optages gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne, hvor celledelingen i rod- og skudspidser blokeres. Ukrudtsplanterne vil visne bort i løbet af 2-3 uger. **Turflin[®] plænerens** er regnfast 2 timer efter sprøjtning.

BEMÆRK:

Den bedste ukrudtskontrol opnås, når planterne er i god vækst. Ukrudtsplanternes kimbladstadiet og op til 6 blivende blade bekæmpes lettest. Ved stor ukrudtsbestand anvendes den højest anbefalede dosering.

SPRØJTETEKNIK:

Ved ukrudtssprøjtning anvendes en hånd- eller rygsprøjte. Der anvendes 1,5-2,0 liter vand pr. 100 m². Den sikreste virkning opnås når temperaturen på sprøjtetidspunktet er over 10-12°C. Sprøjtning med **Turflin[®] plænerens** frarådes når ukrudtet er under stress pga. tørke, vandlidende jord, samt hvis der er udsigt til en periode med frost omkring behandlingen.

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKE:

Fyld en beholder halvt med vand og tilsæt den beregnede mængde **Turflin[®] plænerens**. Resten af vandet tilsættes. Omrør eller ryst væskebeholderen under blanding og før udsprøjtning.

LAGRING:

Hold beholderen lukket og opbevar **Turflin[®] plænerens** frostfrit.

DOSERING:

Anbefalet dosering for **Turflin[®] plænerens**.

Doseringer:	ml/100m ²
Agersennep, burresnerre, bellis (tusindefryd), blegpileurt, brandbæger, ferskenpileurt, forglemmigøj, fuglegræs, gåsefod, hanekro, haremåd, hønssetarm, kamille, hyrdetaske, kløver, kålarter, mælkebøtte, nælde, pengeurt, raps, snerlepileurt, svinemælk, svinemælde, smørblomst, valmue, vejpileurt og tvetand.	40-50
Jordrøg, stedmoder, spergel, tidsel, vejbred og ærenpris.	50-60

BEMÆRK:

Mange grøntsager, blomster, prydplanter og træer kan skades af **Turflin[®] plænerens**. Ved sprøjtning nær sådanne kulturer skal man undgå at vinddrift får sprøjtevæsken til at drive over på planterne. Undlad at anvende græs behandlet med **Turflin[®] plænerens** til kompost. Sørg for at rense sprøjten grundigt efter brug. Anvend vand tilsat 10 ml ammoniak (salmiakspiritus) pr. liter vand. Skyl også slange og dyser. Udsprøjt skyllevandet på det areal, som lige er blevet behandlet.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagsrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Turflin[®] plænerens er et bredspektret ukrudtsmiddel, der effektivt bekæmper de mest almindelige tokimbladede ukrudtsarter på græsarealer.

Turflin[®] plænerens kan anvendes fra græssets 3-4 bladstadiet.