



Ole Grønbæk
Produktchef
DLF-TRIFOLIUM A/S

Er din græsmark i form til en sæson mere?

Efter endnu en vinter med snedække, som sled på græsmarkerne, er det i juli-august tid til igen at give græsmarkerne en kritisk gennemgang.

- Er den mark, der i foråret så ud til at være OK, også i stand til at klare endnu en vinter – og yde det den skal næste år?
- Hvordan ser den samlede foderforsyning ud efter de første slæt?

Ny græsmark i august


August er en meget velegnet og populær måned til etablering af nye græsmarker – det har flere og flere opdaget ved selvsyn. Jorden er varm, og hvis der er tilstrækkelig fugtighed til stede, spirer frøet hurtigt og ensartet. Forsøgene viser klart, at der er et højt udbytte at hente det følgende år – over 12.000 FE pr. ha med god foderværdi. Også beretninger fra praksis fortæller om gode resultater med udlæg efter korn om sommeren. Efter sidste slæt kan græsmarken

også erstattes med et nyt udlæg - dog kun på ejendomme under 1,7 DE/ha og ved såning inden 15. august.

Oversåning

Fornyelse af græsmarken ved oversåning kan være et alternativ, hvis marken ikke må eller kan omlægges. Hertil bør frøblandinger med stort indhold af hurtigt voksende arter (rajgræs og/eller rajsvingel af rajgræstypen) anvendes, og såningen sker bedst med skiveskærmaskine – alternativt græsmarksstrigle med frøsåkasse.

HØJESTE UDBYTTET VED TIDLIG SÅNING



Udbytte i 1. slæt af sommerudlagt kløvergræs i renbestand og med dæksæd af hvede. 1. slæt høstet 29. maj. 5 forsøg (2 tidligt såede, 3 sent), udlæg 2005, høst 2006. Videncenter for Landbrug 2006.

Konklusioner om sommerudlæg

- Bedste metode for udlæg af kløvergræs er uden dæksæd i første halvdel af august
- Der er ikke væsentligt merudbytte for at anvende dæksæd, så 30-40 kg vinterhvede bør kun anvendes, når såtiden er efter midten af august
- Vintertriticale kan bruges, hvis hveden ikke overvintrer sikkert
- Foderværdien falder ved sent udlæg
- Græsmarker udlagt i vinterhvede skal høstes før begyndende skridning i græs og hvede
- Udsædsmængde 30-32 kg pr. ha af frøblandingen
- Såning af udlæg skal ske i fugtig jord hurtigst muligt efter høst af foregående afgrøde for at undgå udtørring af jorden
- Vær opmærksom på bladrandbiller i kløver

- Græsset må ikke være mere end 6-7 cm før vinteren. Afpudsning kan være nødvendig
- Alle frøblandinger, der hovedsagelig indeholder hurtigt voksende rajgræsser og rajsvingel, kan sås om sommeren.



DLF-TRIFOLIUM har udviklet nye proteinblandinger for at øge andelen af hjemmeavlet protein – kontakt en af vores forhandlere for at høre nærmere.